

Longapen



Longapen, 300 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań dla bydła i świń

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ **Benzylpenicylina prokainowa 300 mg/ml**

Oleista zawiesina do wstrzykiwań o barwie białej do białawej.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Produkt jest dobrze tolerowany, jedynie sporadycznie obserwuje się przemijające nieznaczne odczyny miejscowe. Niekiedy u prosiąt ssących lub warchlaków podanie penicylin może wywołać przemijające podwyższenie temperatury ciała, wymioty, drżenia, zubożnienie i zaburzenia koordynacji ruchów.

Okazjonalnie, po zastosowaniu penicylin u ciężarnych loch oraz u loszek obserwowano obrzęk sromu oraz rozszerzenie i wypływ ze szpary sromowej, co mogło być związane z przypadkami poronień.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej <http://www.urpl.gov.pl> (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

DAWKOWANIE I DROGI PODANIA

U bydła produkt wstrzykuje się domięśniowo lub podskórnie, u krów w laktacji produkt podaje się domięśniowo. U świń produkt podaje się domięśniowo.

Zalecana dawka substancji czynnej to 20 mg/kg m.c., co odpowiada podaniu 1 ml produktu/15 kg m.c. Zależnie od stanu pacjenta produkt można podać powtórnie po 72 godzinach.

OKRESY KARENCJI

Bydło:

Tkanki jadalne: po podaniu podskórnym - 10 dni

po podaniu domięśniowym - 21 dni

Mleko: 5 dni

Świnie:

Tkanki jadalne: 7 dni

I TRANSPORT

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

**Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego
lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.**

INNE INFORMACJE

**W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu
leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z
podmiotem odpowiedzialnym.**

Dostępne opakowania:

Butelki szklane zawierające 50 lub 100 ml produktu.

Pozwolenie nr 1747/07

[http://scanvet.pl/en/offer/veterinarians/medicinal-products/pigs/rid,38.h
tml](http://scanvet.pl/en/offer/veterinarians/medicinal-products/pigs/rid,38.html)