

## Longapen



Longapen, 300 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań dla bydła i świń

### **SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ** **Benzylpenicylina prokainowa 300 mg/ml**

**Oleista zawiesina do wstrzykiwań o barwie białej do białawej.**

### **DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE**

**Produkt jest dobrze tolerowany, jedynie sporadycznie obserwuje się przemijające nieznaczne odczyny miejscowe. Niekiedy u prosiąt ssących lub warchlaków podanie penicylin może wywołać przemijające podwyższenie temperatury ciała, wymioty, drżenia, zubożnienie i zaburzenia koordynacji ruchów.**

**Okazjonalnie, po zastosowaniu penicylin u ciężarnych loch oraz u loszek obserwowano obrzęk sromu oraz rozszerzenie i wypływ ze szpary sromowej, co mogło być związane z przypadkami poronień.**

**O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej <http://www.urpl.gov.pl> (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).**

### **DAWKOWANIE I DROGI PODANIA**

**U bydła produkt wstrzykuje się domięśniowo lub podskórnie, u krów w laktacji produkt podaje się domięśniowo. U świń produkt podaje się domięśniowo.**

**Zalecana dawka substancji czynnej to 20 mg/kg m.c., co odpowiada podaniu 1 ml produktu/15 kg m.c. Zależnie od stanu pacjenta produkt można podać powtórnie po 72 godzinach.**

### **OKRESY KARENCJI**

**Bydło:**

**Tkanki jadalne: po podaniu podskórnym - 10 dni**

**po podaniu domięśniowym - 21 dni**

**Mleko: 5 dni**

**Świnie:**

**Tkanki jadalne: 7 dni**

#### **I TRANSPORCIE**

**Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.**

**Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.**

#### **SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE**

**Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.  
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego  
lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.**

#### **INNE INFORMACJE**

**W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu  
leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z  
podmiotem odpowiedzialnym.**

**Dostępne opakowania:**

**Butelki szklane zawierające 50 lub 100 ml produktu.**

Pozwolenie nr 1747/07

[http://scanvet.pl/en/offer/veterinarians/medicinal-products/pigs/rid,38.h  
tml](http://scanvet.pl/en/offer/veterinarians/medicinal-products/pigs/rid,38.html)