

Oxytet Spray



SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Oksytetracykliny chlorowodorek 32,1 mg/ml
(co odpowiada 29,7 mg oksytetracykliny/ml)

RODZAJ I WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

Pojemnik ciśnieniowy z LDPE/Aluminium z zaworem dozującym z PE oraz wieczkiem z PE. Pojemnik zawiera 140 g produktu.

WSKAZANIA LECZNICZE

Oxytet Spray jest wskazany do stosowania w powierzchownych zakażeniach skóry i racic (w szczególności międzypalcowego zapalenia skóry, zanokcicy) u bydła, owiec i świń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na działanie oksytetracykliny.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na tetracykliny.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Brak.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej <http://www.urpl.gov.pl> (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

DAWKOWANIE I DROGA PODANIA

Przed zastosowaniem produktu leczone miejsca należy dokładnie oczyścić a racice należy wyczyścić i w razie potrzeby przyciąć. W przypadku leczenia zakażeń racic zalecane jest, aby przed powrotem na pastwisko zwierzęta przez godzinę pozostały na suchym podłożu.

Wstrząsnąć pojemnik przed użyciem. Spryskiwać przez kilka sekund do momentu całkowitego pokrycia leczonych zmian preparatem.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Brak.

OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne: zero godzin.

Mleko krów, owiec: zero godzin.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem. Pojemnik pod ciśnieniem, nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C. Nie przebijać i nie spalać nawet po opróżnieniu opakowania.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić oczy zwierząt przed kontaktem z produktem

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Chronić oczy.

Unikać kontaktu ze skórą.

Unikać wdychania oparów.

Po użyciu umyć ręce.

Nie rozpylać w pobliżu ognia lub żarzących się materiałów.

Produkt wysoce łatwopalny.

Należy stosować wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Nie palić podczas stosowania produktu.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Wyłącznie dla zwierząt.

Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

Pozwolenie nr: 2079/11

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ETYKIETO-ULOTKI

28/03/2011

<http://scanvet.pl/oferta/lekarze-weterynarii/produkty-lecznicze/swinie/r/id,49.html>