

## Scancox 50 mg/ml zawiesina doustna dla świń



Scancox 50 mg/ml zawiesina doustna dla świń

### **1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII**

#### **Podmiot odpowiedzialny:**

Lavet Pharmaceuticals Ltd.  
Ottó u. 14.  
Budapeszt H-1161  
Węgry

#### **Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:**

Lavet Pharmaceuticals Ltd.,  
Batthyány u. 6., Kistarcsa, H-2143  
Węgry

### **2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO**

Scancox 50 mg/ml zawiesina doustna dla świń  
Toltrazuryl

### **3. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI**

#### **1 ml zawiera:**

#### **Substancja czynna:**

**Toltrazuryl** 50 mg

#### **Substancje pomocnicze:**

Sodu benzoesan (E211) 2 mg  
Sodu propionian (E281) 2 mg  
Biała lub prawie biała zawiesina.

### **4. WSKAZANIA LECZNICZE**

Zapobieganie objawom klinicznym kokcydiozy u nowonarodzonych prosiąt (w wieku od 3 do 5 dni)  
na fermach z potwierdzonym występowaniem kokcydiozy w przeszłości, wywoływanej przez *Isospora suis*.

### **5. PRZECIWSKAZANIA**

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

### **6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE**

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.

## **7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT**

Świnie (prosięta w wieku od 3 do 5 dni).

## **8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA**

Każdemu prosięciu w 3-5 dniu życia należy podać jednorazową dawkę doustną wynoszącą 20 mg

toltrazurylu/kg m.c., co odpowiada 0,4 ml zawiesiny doustnej na kg m.c.

Leczenie podczas wybuchu choroby może mieć ograniczoną wartość dla pojedynczych prosiąt ze

względu na już istniejące uszkodzenia w obrębie jelita cienkiego.

## **9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA**

Do podawania doustnego.

Zawiesinę doustną należy silnie wstrząsnąć przed użyciem.

Leczenie pojedynczych zwierząt.

Ponieważ małe objętości są wymagane do leczenia pojedynczych prosiąt, zalecane jest użycie

sprzętu dozującego o dokładności 0,1 ml.

## **10. OKRES KARENCCI**

Tkanki jadalne: 77 dni

## **11. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU**

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie używać po upływie daty ważności podanej na etykiecie, po EXP.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 3 miesiące.

## **12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA**

### **Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt**

Tak jak przy innych środkach przeciwpasożytniczych, częste i powtarzane użycie leków

przeciwpierwotniakowych z tej samej klasy może prowadzić do narastania oporności.

Zaleca się podawać wszystkim zwierzętom znajdującym się w zagrodzie.

Przestrzeganie zasad czystości może zredukować ryzyko zakażenia kokcydiami.

Dlatego zaleca się poprawę warunków higienicznych w danym obiekcie szczególnie w zakresie suchości i czystości.

### **Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania**

#### **i) Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt**

Brak

#### **ii) Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom**

W przypadku dostania się produktu na skórę lub do oczu należy natychmiast przemyć wodą.

Po użyciu umyć ręce. Nie palić, nie jeść i nie pić podczas używania produktu.

Osoby o znanej nadwrażliwości na toltrazuryl, powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym

weterynaryjnym.

### **Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności**

**Nie dotyczy.****Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji**

Nieznane, np. nie ma interakcji w połączeniu z suplementacją żelaza.

**Przedawkowanie**

Nie zaobserwowano działań niepożądanych u prosiąt, po podaniu dawki trzykrotnie przekraczającej zalecaną.

**Niezgodności**

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

**13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY UNIESZKODLIWIANIU NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTÓW, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE**

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii.

Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

**14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.**

18/10/2012

**15. INNE INFORMACJE**

250 ml i 1000 ml

Butelka HDPE z zakrętką HDPE.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy

kontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego:

ScanVet Poland Sp. z o.o.

Skierszewo,

ul. Kiszowska 9

62-200 Gniezno

tel. 61 4264920

fax. 61 4241147

<http://scanvet.pl/oferta/lekarze-weterynarii/produkty-lecznicze/swinie/r/id,81.html>