

UroCeum



Kup w naszym sklepie

UroCeum - Mieszanka paszowa uzupełniająca - dietetyczna dla psów i kotów

Wspomaga układ moczowy u psów i kotów

Skład w 1ml:

Żurawina (mikrokapsułkowany, skoncentrowany wyciąg z żurawiny) - 50mg

Wyciąg z pietruszki- 50 mg

Glukozamina- 75 mg

L-teanina- 15 mg

MSM - 50 mg

Bez dodatku barwników i aromatów.

Zastosowanie:

Składniki zawarte w UroCeum wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego u psów i kotów, mogą być stosowane:

- u zwierząt z tendencją do stanów zapalnych dolnych dróg moczowych i nawracających zakażeń dróg moczowych
- u zwierząt z tendencją do krystalurii i kamicy dróg moczowych
- wspomagająco przy stanach zapalnych dolnych dróg moczowych
- wspomagająco przy chorobach dolnych dróg moczowych kotów (FUS/FLUTD - *feline lower urinary tract disease*), w tym przy idiopatycznym/śródmiażdżowym zapaleniu pęcherza moczowego (FIC - *feline interstitial cystitis*)*
- osłonowo u zwierząt po zabiegu cewnikowania dróg moczowych oraz po zabiegach urologicznych (po konsultacji z lekarzem weterynarii)

Właściwości:

Unikalna kompozycja 5 składników, które zapewniają wielokierunkowe działanie wspomagające układ moczowy u psów i kotów:

- ograniczają adhezję bakterii uropatogennych (np. E.coli) do ściany pęcherza moczowego
- ułatwiają eliminację drobnoustrojów z dróg moczowych
- sprzyjają regeneracji bariery ochronnej pęcherza moczowego
- wspierają naturalną odporność układu moczowego na infekcje
- wykazują naturalne działanie moczopędne
- ułatwiają eliminację kryształów i toksyn z układu moczowego
- przyczyniają się do utrzymania zdrowych dróg moczowych

Żurawina zawiera substancje o udowodnionym działaniu antyadhezyjnym wobec bakterii uropatogennych. Opatentowany wyciąg z żurawiny zawarty w UroCeum jest pozyskiwany z całych owoców żurawiny, standaryzowany do zawartości 7,2% proantocyjanidyn. Jest to jedyny, skoncentrowany wyciąg z żurawiny, w którym zastosowano opatentowaną technologię mikrokapsulacji. Dzięki temu aktywne substancje wykazują wysoką biodostępność - cenne proantocyjanidyny (PAC) oraz polifenole są chronione przed zniszczeniem przez kwas żołądkowy. Aktywne składniki ekstraktu zapobiegają przyleganiu bakterii (np. *Escherichia coli*) do nabłonka dróg moczowych. Ich mechanizm działania

polega na łączeniu się z receptorami powierzchniowymi komórek bakterii, co blokuje zdolność bakterii przylegania do nabłonka błony śluzowej pęcherza moczowego. W ten sposób żurawina ułatwia eliminację bakterii z dróg moczowych, chroni przed namnażaniem drobnoustrojów i rozwojem zakażenia. UroCeum to jedyny taki produkt dla psów i kotów z mikrokapsułkowaną żurawiną.

Glukozamina jest prekursorem glikozaminoglikanów wchodzących w skład warstwy ochronnej dolnych dróg moczowych, sprzyja regeneracji i uszczelnieniu bariery ochronnej pęcherza moczowego, co zmniejsza przepuszczalność dla drobnoustrojów i innych szkodliwych czynników, mogących wywoływać podrażnienie i stan zapalny pęcherza moczowego.

MSM stanowi źródło siarki niezbędnej do syntezy glikozaminoglikanów i posiada naturalne właściwości antyoksydacyjne.

L-teanina łagodzi stres i wykazuje szereg korzystnych właściwości wpływając na poprawę nastroju, zmniejszenie lęku i niepokoju: zwiększa poziom GABA (neuroprzebieg hamujący, obniża stany lękowe), zwiększa stężenie glicyny (neuroprzebieg hamujący, odpowiada m.in. za uczucie spokoju), może wykazywać działanie neuroprotektoryjne, zwiększa aktywność fal mózgowych alfa (stan relaksu, ale bez uczucia senności). Ma to szczególne znaczenie u kotów, u których stres jest istotnym czynnikiem mogącym nasilać lub indukować wystąpienie objawów FLUTD*.

Wyciąg z pietruszki wspiera funkcje wydalnicze nerek i wykazuje naturalne działanie moczopędne, dzięki czemu wspomaga usuwanie toksyn i wypłukiwanie drobnoustrojów z dróg moczowych.

Sposób podawania:

Przed użyciem wstrząsnąć. Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii.

Koty: 1ml/5kg m.c.

Psy: 2ml/10kg m.c.

Wspomagająco przy stanach zapalnych dróg moczowych stosować przez 3-4 tygodnie lub zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii. Profilaktycznie u zwierząt z tendencją do stanów zapalnych dróg moczowych może być stosowany przez dłuższy czas. Zalecany czas stosowania: do 6 miesięcy. Po cewnikowaniu podawać przez 5 dni lub zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii.

Produkt można podawać zmieszany z karmą lub bezpośrednio do jamy ustnej. Należy zapewnić stały dostęp do wody do picia. Strzykawkę dozującą należy umyć po każdym użyciu.

Skład: Woda, sacharoza, siarczan glukozaminy, polidekstroza, dimetylosulfon (MSM), produkty przetworzenia roślin: wyciąg z pietruszki (*Petroselinum sativum*), żurawina (*Vaccinium macrocarpon*, mikrokapsułkowany, skoncentrowany wyciąg), L-teanina; Dodatki: 1a: kwas cytrynowy (E330), sorbinian potasu (E202), 1e: guma ksantanowa (E415). Zawartość i rodzaj substancji zakwaszających mocz: wyciąg z żurawiny 50mg/ml.

Składniki analityczne i poziomy: Białko surowe <0,5%, Włókno surowe 1%, Oleje i tłuszcze surowe <0,5%, Popiół surowy <0,5%, Zawartość wilgoci 67%, Wapń <0,1%, Fosfor <0,1%, Sód<0,1%, Magnez <0,1%, Potas: 1,7%, Chlorki: 1,2%, Siarka: 3,4%.

Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

Wyłącznie dla zwierząt. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Dystrybutor i podmiot odpowiedzialny za etykietowanie:

ScanVet Poland Sp. z o.o., Skierszewo, ul. Kiszowska 9, 62-200 Gniezno, tel. 614264920, WNI: PL3003182p. **Wytwórca:** Zakład Produkcyjny, Kosewo 144, 05-190 Nasielsk, WNI: αPL1414002p

Opakowania: Butelka 100ml ze strzykawką dozującą

Bezpłatna informacja na temat produktu: www.scanvet.pl

* Choroba dolnych dróg moczowych (FLUTD/FUS), w tym idiopatyczne zapalenie pęcherza u kotów (FIC), jest schorzeniem o skomplikowanym podłożu. Czynnikiem sprzyjającym nasileniu objawów jest m.in. stres, a także zmiany w budowie warstwy ochronnej błony śluzowej pęcherza, w której skład wchodzi glikozaminoglikany (GAG). Ta warstwa ochronna pełni istotną funkcję - aktywnie chroni przed przenikaniem szkodliwych składników moczu, osadzeniem się drobnoustrojowych czy kryształów, z których mogą powstawać kamienie moczowe. Zaburzenie bariery ochronnej pęcherza moczowego sprzyja podrażnieniu głębszych warstw pęcherza przez składniki moczu oraz rozwojowi stanu zapalnego. U kotów cierpiących z powodu tego schorzenia bardzo ważne jest przestrzeganie zaleceń lekarza weterynarii, zachęcanie kota do pobierania odpowiedniej ilości wody (np. rozstawiając większą liczbę misek z wodą, stosując specjalne poidełka i wodne fontanny), zapewnienie spokojnego, komfortowego otoczenia i ograniczenie stresu.

<http://scanvet.pl/oferta/lekarze-weterynarii/suplementyplegnacja/zwierzeta-towarzyszace/rid,150.html>