

INTRAVIT B12 500µg/ml



INTRAVIT B12
500µg/ml, roztwór do wstrzykiwań

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
ScanVet Poland Sp. z o.o.
Skierszewo,
ul. Kiszkowska 9
62-200 Gniezno

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

INTRAVIT B12, 500µg/ml, roztwór do wstrzykiwań

3. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 ml zawiera:
Cyjanokobalamina (witamina B12) 500 µg

4. WSKAZANIA LECZNICZE

Stosować w celu zwalczania niedoboru witaminy B12 (niedokrwistość, leukopenia, zatrzymanie wzrostu, charłactwo, zapalenie nerwów, uszkodzenia skóry). Polecany także do zwalczania zaburzeń funkcjonalnych wątroby (np. w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby).

5. PRZECIWWSKAZANIA

Nieznane

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W miejscu iniekcji mogą pojawić się, krótko utrzymujące się odczyny alergiczne

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej <http://www.urpl.gov.pl> (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, koń, świnia, owca, koza, pies, kot

8. DAWKOWANIE I DROGI PODANIA

Wstrzykiwać domięśniowo lub podskórnio, 1 lub 2 razy w tygodniu, w dawce:

Konie, bydło	2 - 5 ml
Cielęta, źrebięta	1 - 3 ml
Świnie, owce, kozy	0,5 - 1,5 ml
Psy i koty	0,5 - 1 ml

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

W celu prawidłowego podania produktu leczniczego należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej ulotce.

10. OKRESY KARENCJI

Pies, kot- nie dotyczy

Bydło, koń, owca, koza, świnia- zero dni

11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Chronić przed światłem.

Nie używać po upływie terminu ważności zamieszczonym na etykiecie.

Okres trwałości produktu leczniczego po pierwszym otwarciu opakowania - 28 dni.

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE

W miejscu iniekcji mogą pojawić się, krótko utrzymujące się odczyny alergiczne.

W przypadku przedostania się leku do oka lub na powierzchnię skóry - przemyć dużą ilością wody.

Witamina B12 nie wywiera działania toksycznego nawet przy stosowaniu w wysokich dawkach przez długi okres czasu. Przy podawaniu myszom jednorazowej dawki 1600 mg/kg m.c. nie zaobserwowano wystąpienia żadnych efektów ubocznych. Dawki przewyższające 1000-krotnie zapotrzebowanie pokarmowe na tą witaminę są bezpieczne dla większości gatunków zwierząt.

13. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY ULOTKI

11/12/2008

15. INNE INFORMACJE

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy skontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

ScanVet Poland Sp. z o.o.

Skierszewo, ul. Kiszowska 9

62-200 Gniezno

Tel.: (061) 426 49 20

Fax.: (061) 424 11 47

Dostępne opakowania:

Butelka ze szkła oranżowego typu II o pojemności 100 ml z korkiem z gumy bromobutyłowej oraz aluminiowym uszczelnieniem.

Pozwolenie nr: 37/94

<http://scanvet.pl/en/offer/veterinarians/medicinal-products/ccattle/rid,34.html>